

Mignot S, Ringa V, Vigoureux S, Panjo H, Saulnier PJ, Fritel X

Contraception et dépistage précoce du cancer du col de l'utérus chez les moins de 25 ans, analyse à partir de la cohorte Constances

21e Congrès national du Collège national des généralistes enseignants (CNGE) Collège académique, 16-18 juin 2021, Bordeaux

RÉSUMÉ

CONTEXTE - Le Human papillomavirus (HPV) est responsable de quasiment l'ensemble des cancers du col de l'utérus. C'est la plus fréquente des infections virales sexuellement transmissibles, la prévalence chez les femmes de moins de 25 ans est la plus forte variant de 29% à 45% en Europe. De nombreux pays recommandent de commencer le dépistage du cancer du col de l'utérus à partir de l'âge de 25 ans. Un dépistage prématuré (avant 25 ans) peut favoriser des examens non nécessaires et des complications ou des refus de soins ultérieurs. OBJECTIFS - Notre objectif est de préciser si des modalités contraceptives sont associées à un dépistage prématuré. METHODE - Cette étude transversale basée sur les données de la cohorte CONSTANCES a inclus 4297 femmes âgées de moins de 25 ans. Les facteurs associés à un dépistage prématuré ont été analysés par régression logistique. Les données manquantes ont été imputées. L'analyse multivariée a été ajustée sur la vie sexuelle, l'état de santé, les données socio-économiques. RESULTATS - 48.5% des femmes de moins de 25 ans avaient déjà réalisé un dépistage prématuré. Les femmes sans contraception (aOR=0.3; CI95% [0.3-0.5]) et qui utilisaient un moyen de contraception non médical (préservatif, spermicides, etc.) (aOR=0.5; CI95% [0.4-0.6]) avaient réalisé moins souvent un dépistage prématuré que celles qui utilisaient une pilule. Les femmes de 20 ans et celles qui avaient eu plus de 5 partenaires au cours de leur vie avaient plus de risque de dépistage prématuré (aOR=2.7; CI95% [2.2-3.3]) et (aOR=2.5; CI95% [2.0-3.1]) respectivement par rapport aux femmes plus jeunes et celles ayant eu moins de 5 partenaires au cours de leur vie. DISCUSSION - Les jeunes femmes qui utilisent une contraception nécessitant une prescription médicale sont plus exposées à un dépistage prématuré que celles sans contraception ou sous contraception non-médicalisée.

MOTS CLÉS : -

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES, [ICI](#)